

# Übersicht Zwischenfrüchte Senf, Ölrettich und Phacelia



Boniturnoten aus der "Beschreibenden Sortenliste 2019" des Bundessortenamtes

Zwischenfrucht	Sortenbezeichnung	Anfälligkeit für Rübennematoden	Massebildung am Anfang	Neigung zum Blühen	Neigung zu Lager	Zulassungsjahr	
Senf	Abraham	2	6	4	3	2003	
Senf	Accent	2	7	4	3	2002	
Senf	Achilles	2	6	4	2	1998	
Senf	Ackergold	2	7	3	3	2018	
Senf	Action	2	8	3	3	2014	
Senf	Admiral	2	5	3	1	1998	
Senf	Architect	2	6	4	2	2003	
Senf	Athlet	2	6	3	2	2008	
Senf	Attack	2	6	5	4	2006	
Senf	Brilliant	2	6	4	2	2011	
Senf	Brisant	2	6	5	1	2010	
Senf	Clint	2	7	3	2	2016	
Senf	Collina	2	7	3	3	2012	
Senf	Conceptone	1	6	3	4	2017	
Senf	Convex	2	4	2	1	2019	neu
Senf	Director	2	6	3	2	2019	neu
Senf	Emilia	2	6	3	3	2019	neu
Senf	Floraine	2	6	2	2	2016	
Senf	Forenza	2	6	3	2	2019	neu
Senf	Forum	2	7	4	3	2003	
Senf	Fox	1	6	3	2	2018	
Senf	Freestyle	2	5	2	3	2017	
Senf	Greco	2	6	4	2	2005	
Senf	Indian Summer	2	7	3	3	2012	
Senf	Iris	2	7	3	2	2012	
Senf	Katina	2	7	3	2	2016	
Senf	Lotus	2	6	3	3	2004	
Senf	Lucida	2	5	2	1	2013	
Senf	Luna	2	7	5	3	2002	
Senf	Master	2	8	4	3	2012	

## Legende zu den Ausprägungsstufen der Merkmale:

- 1 = sehr gering
- 8 = stark
- = keine Einstufung

# Übersicht Zwischenfrüchte Senf, Ölrettich und Phacelia



Boniturnoten aus der "Beschreibenden Sortenliste 2019" des Bundessortenamtes

Zwischenfrucht	Sortenbezeichnung	Anfälligkeit für Rübennematoden				Zulassungsjahr
		Massebildung am Anfang	Neigung zum Blühen	Neigung zu Lager		
Senf	Medicus	2	6	4	3	2001
Senf	Odysseus	2	6	4	3	2011
Senf	Oscar	2	5	5	2	1990
Senf	Passion	2	6	4	2	2009
Senf	Pole Position	2	7	3	2	2011
Senf	Profi	2	7	3	3	2006
Senf	Rexx	1	6	3	2	2019 neu
Senf	Rumba	2	6	3	2	2006
Senf	Saloon	2	7	4	3	2002
Senf	Santa Fe	2	7	4	3	1992
Senf	Scout	2	8	4	3	2014
Senf	Sibelius	2	5	3	2	2008
Senf	Sigri	2	6	2	2	2005
Senf	Simplex	2	6	2	2	2019 neu
Senf	Sinex	2	5	2	2	2019 neu
Senf	Sirte	2	7	3	4	2004
Senf	Solo	2	6	3	4	2018
Senf	Sunny	2	8	3	3	2018
Senf	Symbol	2	6	4	2	2011
Senf	Topas	2	7	3	3	2015
Senf	Torpedo	2	7	4	3	1994
Senf	Turbo	2	6	3	3	2019 neu
Senf	Ultra	2	7	5	5	1992
Senf	Venice	2	5	2	1	2013
Senf	Veto	2	6	4	2	2009
Senf	Victoria	1	6	3	3	2017
Senf	Vitaro	2	7	4	2	2012
<b>Ölrettich</b>						
Ölrettich	Adagio	2	5	3	2	1990
Ölrettich	Adam	2	6	4	3	2007
Ölrettich	Adventure	2	5	3	2	2018

**Legende zu den Ausprägungsstufen der Merkmale:**  
 1 = sehr gering  
 8 = stark  
 - = keine Einstufung

# Übersicht Zwischenfrüchte Senf, Ölrettich und Phacelia

Boniturnoten aus der "Beschreibenden Sortenliste 2019" des Bundessortenamtes

Zwischenfrucht	Sortenbezeichnung					
		Anfälligkeit für Rübenematoden	Massebildung am Anfang	Neigung zum Blühen	Neigung zu Lager	Zulassungsjahr
Ölrettich	Agronom	2	8	4	3	2014
Ölrettich	Amigo	1	7	5	4	2017
Ölrettich	Angus	1	7	4	3	2016
Ölrettich	Armita	2	6	3	3	2019 <i>neu</i>
Ölrettich	Atlantis	2	5	3	3	2016
Ölrettich	Baracuda	2	6	3	2	2012
Ölrettich	Black Jack	1	2	2	2	2011
Ölrettich	Caruso	2	6	4	3	2015
Ölrettich	Cassius	2	7	4	3	2002
Ölrettich	Cobra	2	6	3	2	2018
Ölrettich	Comet	1	6	4	4	2004
Ölrettich	Compass	2	6	3	2	2009
Ölrettich	Concorde	2	7	5	3	2011
Ölrettich	Contra	1	5	3	2	2007
Ölrettich	Control	2	7	4	3	2014
Ölrettich	Cordoba	1	7	3	3	2018
Ölrettich	Cosmos	1	5	3	2	2009
Ölrettich	Dacapo	2	6	4	3	1995
Ölrettich	Defender	2	7	4	2	2004
Ölrettich	Diabolo	-	6	4	2	1994
Ölrettich	Discovery	1	6	3	2	2014
Ölrettich	Don Quichote	1	6	4	2	2013
Ölrettich	Doublemax	1	7	4	3	2016
Ölrettich	Dracula	2	4	3	2	2010
Ölrettich	Edwin	2	6	3	2	2011
Ölrettich	Evergreen	2	4	3	2	2008
Ölrettich	Farmer	2	4	3	4	2011
Ölrettich	Firework	1	6	3	3	2017
Ölrettich	Geron	2	7	6	4	2014
Ölrettich	Illusion	2	7	4	2	2009
Ölrettich	Image	1	4	3	2	2007

**Legende zu den Ausprägungsstufen der Merkmale:**  
 1 = sehr gering  
 8 = stark  
 - = keine Einstufung

# Übersicht Zwischenfrüchte Senf, Ölrettich und Phacelia



Boniturnoten aus der "Beschreibenden Sortenliste 2019" des Bundessortenamtes

Zwischenfrucht	Sortenbezeichnung	Anfälligkeit für Rübennekrotosen	Massebildung am Anfang	Neigung zum Blühen	Neigung zu Lager	Zulassungsjahr
Ölrettich	Intermezzo	2	6	3	2	2010
Ölrettich	Jorba	2	6	3	2	2015
Ölrettich	Karakter	2	7	6	4	2003
Ölrettich	Maximus	1	5	3	2	2007
Ölrettich	Melotop	2	7	3	2	2012
Ölrettich	Mercator	2	7	4	3	2013
Ölrettich	Miracle	2	5	4	3	2018
Ölrettich	Octopus	2	6	5	3	2009
Ölrettich	Orca	2	7	4	3	2014
Ölrettich	Pina	2	7	3	2	2011
Ölrettich	Radetzky	2	4	3	2	2010
Ölrettich	Radical	2	6	3	2	1992
Ölrettich	Reaktion KWS	1	7	4	4	2018
Ölrettich	Rebellion KWS	1	8	4	3	2014
Ölrettich	Reportage KWS	1	5	3	2	2016
Ölrettich	Reset	1	4	3	2	2007
Ölrettich	Resolution	2	7	4	2	2011
Ölrettich	Respect	1	4	3	2	2008
Ölrettich	Revolver	1	6	4	2	2007
Ölrettich	Splendid	2	6	8	6	2009
Ölrettich	Success	2	6	4	2	2019
Ölrettich	Suletta	2	6	3	4	2019
Ölrettich	Sulina	2	7	4	4	2019
Ölrettich	Sunday	2	5	2	2	2018
Ölrettich	Triangel	2	6	2	2	2018
Ölrettich	Trident	2	7	3	2	2015
Ölrettich	Valencia	2	6	3	2	2011
Ölrettich	Xcellent	2	6	3	2	2009
<b>Phacelia</b>						
Phacelia	Amerigo	-	5	5	5	1995
Phacelia	Angelia	-	5	5	5	1986

**Legende zu den Ausprägungsstufen der Merkmale:**  
 1 = sehr gering  
 8 = stark  
 - = keine Einstufung

# Übersicht Zwischenfrüchte Senf, Ölrettich und Phacelia

Boniturnoten aus der "Beschreibenden Sortenliste 2019" des Bundessortenamtes

Zwischenfrucht	Sortenbezeichnung	Anfälligkeit für Rübennematoden	Massebildung am Anfang	Neigung zum Blühen	Neigung zu Lager	Zulassungsjahr
Phacelia	Balo	-	5	5	5	1986
Phacelia	Beehappy	-	6	4	4	2007
Phacelia	Boratus	-	6	5	5	1985
Phacelia	Factotum	-	5	5	3	2003
Phacelia	Gipha	-	6	5	5	1986
Phacelia	Julia	-	5	5	5	1986
Phacelia	Lisette	-	6	5	5	1986
Phacelia	Maja KWS	-	6	4	5	2014
Phacelia	Nectar	-	5	4	4	2017
Phacelia	Phaci	-	4	5	5	1987
Phacelia	Protana	-	6	5	5	2013

## Hinweis bei Senf:

Achtung: Falls ein Standort Ditylenchus (Rübenkopffälchen) gefährdet ist, sollte kein Senf angebaut werden, da dieser Wirtspflanze für Rübenkopffälchen ist!

## Hinweis bei Phacelia:

Anbau von Phacelia, Leguminosen oder Ramtillkraut bei Problemen mit Rhizoctonia solani vermeiden.

## Bei der Sortenwahl berücksichtigen:

- geringe Anfälligkeit für Rübennematoden (Ausprägung 1 und 2)
- hohe Massebildung am Anfang
- geringe Neigung zum Blühen
- geringe Neigung zu Lager

## Zum Zwischenfruchtplaner:

[www.bisz.suedzucker.de/anbau/zwischenfruchtanbau/](http://www.bisz.suedzucker.de/anbau/zwischenfruchtanbau/)