

## Behandlung pilzlicher Blattkrankheiten

<u>Erstbehandlung:</u>	Schadsschwellen	<u>Zweit-/Drittbehandlung:</u>
bis 31. Juli	5 % befallene Blätter	bis 15. August 15 % befallene Blätter
vom 01. bis 15. August	15 % befallene Blätter	ab 16. August 45 % befallene Blätter
ab 16. August	45 % befallene Blätter	

(Summenwert aus Cercospora, Ramularia, Mehltau und Rost)

**Beachten Sie unseren gemeinsamen Aufruf zur Bestandeskontrolle auf Krankheitsbefall!**

### Praxis- Hinweis:

- **Blattkrankheiten-Monitoring:** Ab Kontrollaufruf Bestände jede Woche exakt kontrollieren! Rechtzeitig die erste und wenn erforderlich weitere Behandlungen (z. B. bei Spätrodung) im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes durchführen! Auf Beregnungs- und Mulchsaatflächen besonders auf Cercosporabefall achten!

*wöchentliche Informationen über den Befallsverlauf unter:*  
[www.bisz.suedzucker.de](http://www.bisz.suedzucker.de)  
[www.bayernruebe.de](http://www.bayernruebe.de)
- **Wirkstoffwechsel:** Wechsel der Azolwirkstoffe in den Anwendungen!  
**Kontaktfungizide:** Beachten Sie die amtl. Beratung, ob im Jahr 2021 nach Art. 53 "Gefahr in Verzug" ein Einsatz zugelassen wird. Strobilurine sind in Gebieten mit Resistenznachweis nicht sinnvoll!
- **Wasseraufwandmenge:** Für Fungizidbehandlungen werden wegen der besseren Blattbenetzung 300 - 400 l/ha Wasser empfohlen!
- **Spritzzeitpunkt:** Bei Temperaturen über 20 - 25°C und einer rel. Luftfeuchtigkeit unter 60 % sind die Spritzungen in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden durchzuführen!

### **Wirkungseinstufung nur für Werksgebiete Plattling und Rain a. L. wegen bekannter Strobilurinresistenzen und des Azolshiftings**

	<u>*Cercospora</u>	<u>Mehltau</u>	<u>Rost</u>	<u>Ramularia</u>	<u>l/ha / Anw. / Wartezeit</u>
Duett Ultra (Epoxi. + Thiophanat.)	++(+)	++(+)	++	++(+)	0,6/ 2 x/ 28
Rubric (Epoconazol)	++(+)	++(+)	+++	++(+)	1,0/ 2 x/ 28
Juwel (Epoxi. + Kresoxim.)	++(+)	+++	++(+)	+++	1,0/ 1 x/ 28
Mercury (Epoxi. + Azoxystrobin)	++(+)	++(+)	+++	++(+)	1,0/ 2 x/ 28
Retengo <sup>Plus</sup> (Epoxi. + Pyraclostrobin)	+(+)	++(+)	+++	++(+)	1,0/ 2 x/ 28
<b>Epoxiconazolhaltige: Aufbrauchfrist 30.10.2021</b>					
Amistar Gold (Difenoconazol + Azoxy.)	+	+	+++	++(+)	1,0/ 2 x/ 35
Sphere (Cyproconazol + Trifloxystrobin)	+	+++	++	++	0,35/ 1 x/ 21
Score (Difenoconazol)	+	+	+++	++(+)	0,4/ 2 x/ 28
Mercury Pro (Cyproconazol + Azoxy.)	+	+++	++	++	1,0/ 2 x/ 35
Domark 10 EC (Tetraconazol)	+	++	++	++	1,0/ 2 x/ 28
Ortiva (Azoxystrobin)	-	+	+++	++(+)	1,0/ 2 x/ 35

**\*Cercospora: Unter Starkbefall sind nach Untersuchungen der LfL bei allen Produkten Wirkungsminderungen zu befürchten!**

Bei Spurennährstoffmangel sind Mischungen mit Blattdünger (z. B. kupferhaltige Mehrnährstoffdünger) möglich