

## Bekämpfungsrichtwert Zuckerrübe

aktualisiert am 05.05.2022



Auflauf - Schädlinge	Richtwert	Einheit	Termin / Rübenstadium
Ackerschnecke	2	Schnecken / qm	bis 6-Blatt-Stadium
Drahtwurm	6	Larven / qm	bis 8-Blatt-Stadium
Erdfloh	20 oder 40	% der Blattfläche vernichtet	bis 2-Blatt-Stadium
		% geschädigte Pflanzen	
Moosknopfkäfer	20	% geschädigte Pflanzen	bis 8-Blatt-Stadium

Blatt - Schädlinge	Richtwert	Einheit	Termin / Rübenstadium
Gammarieule	10	% vernichtete Blättfläche	(10 % bei Trockenheit)
Erdräupen	> 1	befressene Pflanze je 2 m <sup>2</sup>	
Grüne Pfirsichblattlaus	10	% befallene Pflanzen	bis Bestandesschluss (bis BBCH 39)
Rübenfliege	10	Eier bzw. Larven / Pflanze	bis 2-Blatt-Stadium
	20	Eier bzw. Larven / Pflanze	4-Blatt-Stadium
	30	Eier bzw. Larven / Pflanze	6-Blatt-Stadium
Schwarze Bohnenlaus	30 50	% befallene Pflanzen % befallene Pflanzen	vor Reihenschluß nach Reihenschluß
	bei deutlicher Koloniebildung bis BBCH 14 evtl. Behandlung bereits bei geringerer Befallshäufigkeit		

Wurzel - Schädlinge	Richtwert	Einheit	Termin / Rübenstadium
Nematoden	100 - 500	Eier u. Larven / 100 ml Boden	Probenahme vor Rübenanbau

Blatt - Krankheiten	Richtwert	Einheit	Termin / Rübenstadium
Cercopora / Ramularia / Mehltau / Rost (Mischinfektion)	5 15 45	% befallene Blätter % befallene Blätter % befallene Blätter	Erstbehandlung: bis 31.7. Erstbehandlung: 1. - 15.8. Erstbehandlung: ab 16.8.
	15 45	% befallene Blätter % befallene Blätter	Zweitbehandlung: bis 15.8. Zweitbehandlung: ab 16.8.
	45	% befallene Blätter	weitere Folgebehandlung unabhängig vom Termin